



Pueblo
Community
Health Center



Servicios de Intervención Temprana

www.PuebloCHC.org

¿Qué es el programa EIS?

EIS son las siglas de Early Intervention Services (Servicios de Intervención Temprana), que es un programa del Pueblo Community Health Center (PCHC) para atender a las personas con VIH/SIDA. Los servicios integrales de gestión de casos del Programa EIS incluyen lo siguiente:

- Médico especialista en VIH
- Asistentes médicos y enfermeras gestoras de casos
- Remisión a proveedores de especialidades médicas
- Servicios farmacéuticos
- Atención de salud oral
- Atención a la salud del comportamiento
- Asesoramiento sobre el cumplimiento de la medicación
- Asesoramiento sobre el abuso de sustancias en régimen ambulatorio
- Otros servicios según estén disponibles

¿Se acaba de enterar de que es VIH-positivo?

Puede atemorizar saber que el análisis de sangre del VIH ha dado positivo, pero no es una sentencia de muerte. La prueba significa que usted está infectado con el virus que causa el SIDA, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

¿Qué es el VIH?

El VIH es uno de los muchos virus que pueden enfermarlo. El resfriado común, la gripe, el sarampión y la varicela también son causados por virus. El VIH es un tipo de virus que no puede reproducirse (hacer copias de sí mismo) por sí mismo, sino que ataca a las células del cuerpo y las utiliza para hacer copias de sí mismo.

¿Qué es el SIDA?

El SIDA es la etapa más grave de la infección por el VIH. Es el resultado de la destrucción del sistema inmunitario de la persona infectada. Al dañar el sistema inmunitario, el VIH interfiere en la capacidad del cuerpo para combatir los organismos que causan la enfermedad.

¿Cómo se transmite el VIH?

El VIH se transmite de persona a persona a través de fluidos corporales como la sangre, el semen, los fluidos vaginales o la leche materna infectada. El VIH puede entrar en el cuerpo a través de un corte abierto o una llaga en la piel o a través de una membrana mucosa. Estas membranas se encuentran en el pene, la vagina, el ano, el recto, la boca, la nariz y los ojos. Se puede contraer el VIH a través de las relaciones sexuales (orales, anales o vaginales); compartiendo agujas (como las que se utilizan para inyectarse drogas en la calle); y (muy raramente) por pinchazos accidentales. Las mujeres con VIH pueden infectar al feto durante el embarazo, el parto o la lactancia. No se recomienda la lactancia a las mujeres con VIH.

¿Es diferente el VIH/SIDA en las personas mayores?

En 2018 más de la mitad (51%) de todas las personas con VIH/SIDA en Estados Unidos tenía 50 años o más. Uno de cada seis nuevos diagnósticos son mayores de 50 años.

Las personas mayores pueden tener lidiar con otras enfermedades comunes al envejecimiento, como hipertensión, diabetes o problemas cardíacos. A medida que el VIH/SIDA empeora, muchas personas necesitarán ayuda para moverse y cuidarse. Las personas mayores con VIH/SIDA necesitan el apoyo y la comprensión de sus médicos, familiares y amigos.

¿Padeceré el SIDA ahora que soy VIH positivo?

No todas las personas que tienen el VIH sufrirán de SIDA. Hay personas que han sido VIH positivas durante más de 20 años y no han tenido ninguna enfermedad grave relacionada con el SIDA. Si no se trata, casi todos los casos de VIH se convertirán en sida. El plazo varía mucho de una persona a otra y puede depender de muchos factores, como el estado de salud de la persona y sus comportamientos relacionados con la salud. Tomar sistemáticamente los medicamentos prescritos para el VIH puede prevenir la progresión a esta etapa.

¿Qué es CD4?

Las células CD4 (también conocidas como células T) forman parte del sistema inmunitario del organismo. Estas células reconocen a los virus y bacterias y ayudan al organismo a combatirlos antes de que enferme.

¿Qué es carga viral?

Una prueba de carga viral muestra la cantidad de VIH que hay en su sangre. Cuanto más baja sea la carga viral, menos virus atacarán sus células. Una carga viral baja también significa que es menos probable que el VIH lo enferme. Una carga viral indetectable significa que su carga viral está por debajo del nivel que la prueba puede medir. Incluso si su carga viral es indetectable, sigue habiendo una pequeña cantidad de virus en su cuerpo y usted sigue teniendo el VIH. Todavía puede transmitir el VIH a otras personas. Su objetivo es mantener su carga viral lo más baja posible y su recuento de CD4 lo más alto posible. Así es como puede evitar que el VIH lo enferme.

¿Qué significa mutación viral?

Una "mutación" del VIH es en realidad un ligero cambio en una sección específica del ARN del VIH, el código genético que proporciona todas las instrucciones para el funcionamiento del VIH. Las mutaciones se producen de forma natural, no solo en el VIH, sino también en otros virus.

¿Con qué frecuencia debo hacerme pruebas de laboratorio?

Hay pruebas de laboratorio que se controlan de forma rutinaria. Las pruebas de recuento de CD4 se realizan cada 12 meses. La carga viral se realiza cada 6 meses. El CBC y el CMP se hacen cada 6 meses mientras estén estables. Estas pruebas pueden hacerse con más frecuencia si es necesario. Otras pruebas de laboratorio necesarias, como lípidos y sífilis, se realizan una vez al año. La prueba de la tuberculosis se realiza cada 2 años. La prueba de la hepatitis C se realiza cada 5 años. Se pueden realizar otras pruebas según sea necesario y algunas pueden repetirse si tiene problemas de salud o si tiene un resultado anormal.

Si no está tomando medicamentos para el VIH, es necesario controlar su sistema inmunitario para asegurarse de que se mantiene en un nivel saludable. Si está tomando medicamentos para el VIH, debe asegurarse de que sean eficaces

y que no haya efectos adversos en sus otros sistemas relacionados con los medicamentos o su VIH. Las pruebas de CD4 y de carga viral proporcionan una instantánea de su función inmunitaria y de la cantidad de virus presente en su organismo. El hemograma es un "recuento sanguíneo completo" que incorpora una serie de pruebas de diferentes componentes de su sangre para evaluar la anemia, la infección, así como una serie de otras condiciones. El CMP incluye una prueba de azúcar en sangre y pruebas que controlan las funciones renales y hepáticas. Si su carga viral aumenta mientras toma el medicamento, o si es un paciente nuevo, se puede realizar un genotipo o fenotipo para comprobar qué medicamentos son los más adecuados para usted.

¿Y si me contagio de SIDA?

El SIDA es una indicación de que su CD4 es de 200 o menos o es la aparición de una condición definida como aquella que solo estaría presente con un sistema inmunológico deteriorado. Si su sistema inmunitario está deteriorado, no le protege de otros tipos de infecciones. Estas infecciones se denominan "infecciones oportunistas". Si se determina que está en riesgo o padece una infección oportunista, el médico le tratará con antibióticos. Deberá tomar estos antibióticos todos los días hasta que los análisis de sangre indiquen que es seguro dejar de tomarlos.

¿Qué es una infección oportunista? ¿Cómo puedo protegerme de contraer una infección oportunista?

Las infecciones oportunistas son infecciones que su cuerpo ya no puede combatir porque el VIH ha destruido demasiadas células CD4. Para prevenir las infecciones oportunistas, las investigaciones indican que seguir algunas precauciones le ayudará a evitar contraer una infección oportunista. Estas incluyen lavarse bien las manos, evitar a las personas enfermas, compartir utensilios de comida y tazas, limpiar las cajas de arena (heces de gato) y cultivar el suelo. También se debe practicar el sexo seguro y tomar los medicamentos según lo prescrito.

¿Cuándo tendré que tomar el medicamento?

Los medicamentos para el VIH se prescriben a todos los pacientes diagnosticados con el VIH tan pronto como el médico recibe los resultados de las pruebas de laboratorio para el genotipo. Debe planificar el inicio del medicamento cuando esté preparado para una adherencia del 100%.

¿Debo tomar el(los) medicamento(s) contra el VIH durante el embarazo?

Los medicamentos para el VIH se utilizan durante el embarazo. Es importante que consulte a su médico sobre el medicamento que toma. Si no toma medicamentos para el VIH en la actualidad, se le empezará a administrar medicamentos para proteger al bebé. Los medicamentos para el VIH reducen la cantidad de infección por el VIH en el cuerpo de la madre así como el riesgo de transmitir el VIH al feto. Es importante que acuda a su médico para que pueda empezar a tomar los medicamentos adecuados en el segundo trimestre. Durante el parto, los medicamentos para el VIH se le administrarán por infusión intravenosa y los seguirá tomando por vía oral.

¿Después del nacimiento, el bebé necesitará estar medicado contra el VIH?

Sí. El bebé recibirá medicamento líquido oral para el VIH durante 6 semanas. El bebé también se someterá a la prueba del VIH.

¿Y si también tengo hepatitis C?

Dado que la hepatitis C se transmite de la misma manera que el VIH, muchos pacientes con VIH están coinfectados. En la actualidad existen tratamientos para determinados tipos de hepatitis C que pueden curar este tipo de hepatitis (dependiendo de si el paciente es candidato).

¿Qué es la adherencia?

La adherencia se refiere al grado de seguimiento de un régimen de tratamiento prescrito.

La adherencia incluye tomar los medicamentos para el VIH el 100% de las veces. Si se omite incluso una dosis, el virus tiene la oportunidad de reproducirse más rápidamente y cambiar o mutar. Esto podría dejarle con menos opciones de tratamiento. Los estudios han demostrado que el primer régimen de medicamento tiene la mejor oportunidad de éxito a largo plazo. Los medicamentos deben tomarse a la misma hora del día. Si se salta una dosis por unas horas, puede tomarla, pero no puede duplicar la dosis. Su médico o el gestor de su caso pueden responder a preguntas específicas sobre la medicación. Si tiene problemas para seguir el horario de la medicación, puede programar una alarma o una alerta en el teléfono móvil. Puede llevar un diario de medicación. Puede pedir a sus amigos o familiares que le ayuden a recordárselo. Si tiene efectos secundarios más que ocasionales, puede pedir consejo a su médico o gestor de casos sobre cómo controlar los efectos secundarios.

Si acaba de iniciar el medicamento, es importante que sepa que durante las primeras 2 a 4 semanas puede experimentar efectos secundarios que suelen mejorar lentamente. Si va al hospital o es encarcelado, es posible que tenga que abastecerse de sus propios medicamentos al menos durante los primeros días, así que asegúrese de prepararse para esa situación. Recuerde pedir sus medicamentos con tiempo suficiente y mantener su seguro y otras coberturas al día.

La adherencia también puede aplicarse a las pruebas de laboratorio y a las citas. Si no acude a una cita, su atención puede retrasarse, ya que las agendas suelen estar llenas. La adherencia es la mejor manera de garantizar una atención sanitaria constante.

¿Qué hace mi gestor de casos por mí?

Cuando se convierta en paciente del EIS del PCHC, su administrador de casos programará una cita de admisión con usted. Su administrador de casos le proporciona muchos servicios, incluida la programación de todas sus citas, asistencia para el cumplimiento del medicamento, ayuda para acceder a los recursos de apoyo, etc. Se le proporcionará información de contacto directa para que pueda ponerse en contacto con su gestor de casos cuando lo necesite. Su gestor de casos también puede ayudarle a acceder a servicios de salud conductual, dentales, dietéticos, de atención especializada y otros. Su gestor de casos le ayudará con cualquier pregunta sobre cualquier aspecto de su atención. Su gestor de casos puede hablar con usted sobre el cumplimiento de la medicación, la reducción de riesgos, las prácticas sexuales seguras y otros temas relevantes para la gestión de su atención sanitaria.

Siempre contacte primero a su gestor de casos si necesita hacer o reprogramar una cita; se debe avisar con un mínimo de 48 horas de anticipación cuando sea posible. Si su gestor de casos no está disponible cuando usted llame, puede llamar al 719-543-8711 y pedir hablar con una enfermera de triaje. Es importante que le diga a esta enfermera que usted es un paciente del EIS. Aunque los miembros del personal del PCHC pueden recordarle las próximas citas, es su responsabilidad saber cuándo debe acudir a sus citas. Si usted cancela su cita, su tratamiento puede retrasarse si no hay citas inmediatas disponibles. Si no se presenta a su cita, su gestor de casos se pondrá en contacto con usted. Por favor, mantenga su número de teléfono y su dirección actualizados.

¿Por qué y con qué frecuencia debo ver a mi gestor de casos?

Debe ver a su gestor de casos cada vez que acuda a su médico, así como en otras ocasiones según sus necesidades o su nivel de atención. Los gestores de casos son sus recursos individuales para asegurarse de que se satisfacen sus necesidades de atención sanitaria. También pueden ayudarle a encontrar otros recursos en la comunidad.

¿Qué significa resistencia a los medicamentos?

La resistencia a los medicamentos del VIH significa una reducción de la capacidad de un medicamento, o de una combinación de medicamentos, para bloquear la reproducción del VIH en el organismo. La resistencia a los medicamentos se produce como resultado de cambios o mutaciones en la estructura genética del VIH. Las mutaciones pueden ser comunes en el VIH si los medicamentos no se toman de forma constante. El VIH se reproduce a un ritmo extremadamente rápido y no contiene las proteínas necesarias para corregir los errores que comete durante la copia. [Fuente: www.hivworkshop.com/drug_resistance.htm]

¿Qué hago si los medicamentos generan malestar?

Cada medicamento para el VIH puede tener efectos secundarios. Su médico y su gestor de casos le explicarán muchos de estos efectos secundarios en el momento de la prescripción. Los efectos secundarios más comunes son, entre otros, los siguientes:

La diarrea se produce con más frecuencia al comienzo de un régimen de VIH y tiende a desaparecer a medida que el cuerpo se acostumbra a los medicamentos. Algunos medicamentos se asocian con más frecuencia a la diarrea que otros. La diarrea continua puede hacer que pierda los nutrientes y el agua que necesita el cuerpo. Póngase en contacto con su médico o gestor de casos si la diarrea se prolonga más de un día.

Las náuseas son un efecto secundario habitual de muchos medicamentos que se toman por primera vez. Por lo general, las náuseas no duran mucho tiempo y desaparecen en unas pocas semanas. Las náuseas desaparecen a medida que el cuerpo se acostumbra a los medicamentos. Póngase en contacto con su médico o gestor de casos si vomita después de tomar las pastillas o si tiene episodios repetidos de vómitos durante más de 24 horas.

La fiebre y los síntomas parecidos a los de la gripe, como dolores y fiebre leve de menos de 100 grados, pueden deberse a los medicamentos para el VIH, pero estos síntomas también pueden ser causados por el propio VIH. Póngase en contacto con su gestor de casos/médico si aparecen estos síntomas.

La fatiga y la falta de energía pueden ser resultado de estrés, falta de sueño, deficiencias de vitaminas y minerales, depresión o falta de ejercicio. También puede estar causada por la anemia u otros problemas médicos. Si se presenta este síntoma, póngase en contacto con su gestor de casos/ médico.

El dolor de cabeza puede aparecer la primera vez que toma el medicamento para el VIH. Este efecto secundario tiende a desaparecer a medida que su cuerpo se adapta a los medicamentos. Si el dolor es intenso o dura más de un día, póngase en contacto con su médico o gestor de casos. La mayoría de los síntomas desaparecen al cabo de tres o cuatro semanas.

El gestor de su caso se pondrá en contacto con usted en un plazo de dos semanas después de que se le haya recetado una nueva medicación para asegurarse de que no tiene ningún problema con los nuevos medicamentos. Puede ponerse en contacto con el gestor de su caso si tiene alguna pregunta.

¿Qué debo hacer si se me acaban los medicamentos?

No debe quedarse sin ellos. Asegúrese de pedir sus medicamentos y deje pasar al menos 5 días para que le surtan la(s) receta(s) (2 semanas para pedidos por correo). Tenga en cuenta los fines de semana, vacaciones, viajes, etc. Sus pedidos de medicamentos no deberían ser una emergencia y la mayoría de las farmacias no los tratarán como tales, especialmente las solicitados por correo. A menudo tendrá reabastecimientos, así que llame primero a la farmacia para que se los reabastezcan. Si se le acaban los reabastecimientos, pida a la farmacia que envíe a su médico una solicitud de reabastecimiento. Si tiene problemas para conseguir sus medicamentos, llame a su gestor de casos.

¿Qué es el ADAP? ¿Qué es el programa "Bridging the Gap"?

ADAP es el Programa de Asistencia de Medicamentos para el SIDA que proporciona medicamentos a bajo o ningún costo a las personas con VIH/SIDA. Bridging the Gap (BTG), en Colorado, es un programa de asistencia de medicamentos para personas con VIH/SIDA que tienen derecho a las prestaciones de medicamentos de Medicare (Parte D) o al plan Medicare Advantage (Parte C). Ayuda a los pacientes con los gastos de las primas y de los medicamentos recetados en el plan que elija el paciente (como deducibles, coaseguro y pagos de nivel catastrófico para los medicamentos que también están en el formulario de ADAP). ADAP Medicare Advantage vigente (con beneficios de medicamentos recetados, MAPD y los participantes en la Parte D de Medicare pueden solicitar este programa presentando una solicitud. Esta solicitud debe ser revisada cada 6 meses y de nuevo en diciembre para el programa BTG. HIAPP es un programa para ayudar a quienes califican con seguro privado. SWAP es un programa para ayudar a los que tienen Medicaid.

Si tiene preguntas con respecto a su plan Med D puede comunicarse con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado al 877-640-0006. Para Medicaid u otras preguntas, por favor comuníquese con el registro de PCHC al 719-543-8711. Recuerde mantener su registro actualizado.

¿Por qué necesito ver a mi médico? ¿Con qué frecuencia debo ver a mi médico?

Debe ver a su médico con regularidad, normalmente cada 3-4 meses (o según determine su médico), para que le ayude con el tratamiento de su enfermedad, explicarle la importancia de sus medicamentos y revisar los resultados del laboratorio.

¿A quién debo acudir si mi médico no está en la clínica o si me enfermo fuera del horario de atención?

Si se enferma y su médico del PCHC no está disponible, llame al 719-543-8711. Diga a la recepcionista que es un paciente del EIS y que quiere hablar con la enfermera de triaje. La enfermera de triaje de PCHC le ayudará a hacer una cita con otro proveedor de atención médica en la clínica. Si sus síntomas indican que necesita atención en la sala de emergencias, la enfermera de triaje lo referirá a ese lugar. Se avisará a su gestor de casos. Si necesita asistencia **fuera del horario de la clínica**, llame al número que se indicó arriba. Una enfermera estará disponible para clasificar y ayudarlo con su necesidad médica inmediata o urgente.

¿Cuándo debo acudir al dentista?

Debe acudir al dentista al menos una vez al año. También es posible que deba acudir al dentista si presenta algún síntoma de infecciones, encías doloridas y sangrantes o dolor dental.

¿Cuándo debo acudir a un terapeuta de salud conductual?

Debe acudir a un terapeuta de salud conductual si necesita ayuda con la depresión, ansiedad u otros problemas. También debe considerar la posibilidad de acudir a un terapeuta de salud conductual si su médico o gestor de casos se lo sugieren.

¿Qué pasa si tengo que ir al hospital?

Durante su cita de admisión en el EIS, recibirá una tarjeta que indica al hospital que se ponga en contacto con el PCHC si está en la sala de emergencias o si es hospitalizado. Desafortunadamente, este sistema no es perfecto, así que llame a su gestor de casos para que puedan trabajar con su médico en el hospital. Lleve sus medicamentos con usted en caso de que el hospital no los tenga. También es importante que los médicos vean qué medicamentos toma. Si está hospitalizado, su atención la controlarán los médicos del hospital. No deje de tomar sus medicamentos antes de consultar con el médico del EIS de PCHC y/o el gestor de casos.

¿Qué puedo hacer si tengo un problema de drogas o alcohol?

El consumo de alcohol y drogas puede causar problemas a cualquier persona, pero los pacientes con VIH corren un riesgo mucho mayor de sufrir complicaciones. Estas sustancias podrían interactuar con sus medicamentos o interferir en su eficacia. Si está bajo los efectos de las drogas o el alcohol, puedes olvidar (o negarse) a tomar sus medicamentos, lo que provoca enfermedades o resistencia. Cuando se está bajo los efectos del alcohol, también existe un mayor riesgo de mantener relaciones sexuales sin protección, incluso por parte de las personas más bien intencionadas.

El abuso de drogas y alcohol es un problema de salud grave y hay tratamiento disponible. Por favor, dígame a su gestor de casos si esto es un problema para usted. El gestor de casos puede remitirle a un tratamiento ambulatorio que probablemente pagará el programa EIS de Pueblo Community Health Center. Si se requiere atención hospitalaria, la Red de Salud del Sur de Colorado (SCHN) puede ayudarlo.

¿Cómo puedo reducir el riesgo de transmitir esta infección a otra persona?

Informe siempre a su pareja de que tiene el VIH antes de la actividad sexual. Practique el sexo seguro utilizando un preservativo para el sexo vaginal o anal. Utilice un preservativo o una barrera dental si practica el sexo oral. Estos productos están disponibles de forma gratuita a través de su gestor de casos.

Pregunte por el PREP (un medicamento preventivo) para su pareja.

Grupo de pacientes del EIS

La misión del Consejo Consultivo de Consumidores de Pueblo Community Health Center es mejorar los resultados de la atención médica para los pacientes de EIS. Esto se hace trabajando con el personal de PCHC y otros proveedores de servicios de VIH para abogar por la calidad de la atención, identificar y abordar las oportunidades de mejora, y participar activamente en la conciencia del VIH y la divulgación en la comunidad.

El Consejo Consultivo de Consumidores se reúne cada mes en uno de los centros clínicos. Este grupo está formado por consumidores y proveedores de servicios que trabajan con la comunidad VIH positiva. El Día Mundial del SIDA y el Orgullo de Pueblo son los dos eventos principales en los que participan. Los miembros también ayudan a preparar la encuesta de los pacientes y a identificar las áreas de mejora.

Para obtener información específica sobre el día, la hora y el lugar de reunión del grupo, póngase en contacto con un coordinador de EIS al (719) 543-8718 x 245 o 220.

¿Existen otros organismos en la comunidad que me ayuden a recibir los bienes y servicios que pueda necesitar?

Sí, hay muchas entidades en la región del sureste de Colorado que ayudan a las personas con VIH/SIDA. La siguiente lista no es exhaustiva, pero es un buen punto de partida para conocer los recursos disponibles:

Programa de Asistencia a los Medicamentos contra el Sida

(ADAP) o "Ramsell": 877-640-0006

Centros para discapacitados en Pueblo: 719-546-1271

CHIP (para embarazos): 720-777-4671

Opción del programa HOPE para la crianza de los hijos 720-777-8233

Coalición de Colorado contra el SIDA para la Educación: www.acecolorado.org

Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado 719-545-4650

Conexión con la hepatitis C: 800-390-1202

Educación y recursos sobre el VIH/SIDA: www.TheBody.com

Estado de la solicitud de Medicaid: 800-359-1991

Servicio de atención al cliente de Medicaid: 800-221-3943

Noticias y recursos: www.POZ.com

Servicios para personas sin hogar de Posada: 719-545-8776

Departamento de Servicios Sociales de Pueblo:	719-583-6160
Seguro Social de Pueblo:	719-545-9248
Red de Salud del Sur de Colorado (SCHN):	
(anteriormente SCAP)	Pueblo: 719-924-8925, 719-225-8682
	Colorado Springs: 800-241-5468
Programa estatal de asistencia farmacéutica:	303-692-2783

¿Qué puedo hacer para estar más sano con el VIH/SIDA?

- Tome su(s) medicación(es) según lo prescrito. Si tiene algún problema, póngase en contacto con su gestor de casos.
- Acuda a su gestor de casos, médico, dentista, dietista y/o terapeuta de salud mental cuando esté programado.
- Participe activamente en el cuidado de su salud.
- Manténgase al día con su examen de mantenimiento de la salud y las inmunizaciones.
- Si consume tabaco, déjelo. Hable de dejar de fumar con su gestor de casos, su terapeuta de salud conductual y/o su médico.
- Si consume drogas, déjelas. Hable de los servicios de rehabilitación de drogas con su gestor de casos, su terapeuta de salud conductual y/o su médico.
- Si consume alcohol, déjelo. Hable de los servicios de rehabilitación del alcohol con su gestor de casos, su terapeuta de salud conductual y/o su médico.
- Practique el sexo seguro.

Otra información importante:

- El PCHC ofrece pruebas de VIH GRATUITAS para las parejas o cualquier persona que desee hacerse una prueba. Esto se hace sin cita previa, y está disponible en todas las ubicaciones de PCHC.
- Hay un intercambio disponible de jeringuillas y agujas para los usuarios de drogas intravenosas. Póngase en contacto con el SCHN al 719-924-8925 para obtener más información.
- Existen oportunidades de investigación. Para conocer los ensayos de investigación clínica relacionados con el VIH u otras oportunidades, consulte lo siguiente:


Para obtener información de contacto de los Centros de Control de Enfermedades, llame al Servicio de Información sobre Ensayos Clínicos del SIDA al 1-800-HIV-0440. También puede visitar www.aidsinfo.nih.gov o clinicaltrials.gov para obtener información sobre ensayos clínicos locales/regionales.

Para las oportunidades de UC Health Denver, llame al 303-724-0708.



**Pueblo
Community
Health Center**
www.PuebloCHC.org

(719) 543-8711
www.PuebloCHC.org



Este folleto está diseñado como un recurso para los pacientes del Programa de Servicios de Intervención Temprana de Pueblo Community Health Center. No incluye todo y debe usarse como una guía para navegar por varios sistemas y servicios dentro del entorno de la atención médica.