



Pueblo
Community
Health Center



Servicios de Intervención Temprana

www.PuebloCHC.org

¿Qué es EIS?

EIS significa Servicios de Intervención Temprana. Es un programa de Pueblo Community Health Center (PCHC, por sus siglas en inglés) para atender a personas que viven con VIH/SIDA. Los servicios integrales de gestión de casos dentro del Programa EIS incluyen lo siguiente:

- Médico especialista en VIH
- Asistente médico y enfermeros administradores de casos
- Servicios farmacéuticos
- Cuidado de la salud oral
- Atención de salud conductual
- Derivaciones a proveedores de especialidades médicas
- Asesoramiento de adherencia a la terapia con medicamentos
- Asesoramiento ambulatorio sobre abuso de sustancias
- Otros servicios disponibles

¿Qué es el VIH?

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) es un virus que ataca una parte del cuerpo llamada sistema inmunitario, que es el sistema de defensa del cuerpo contra los gérmenes. Cuando el VIH infecta su cuerpo, comienza a debilitar su sistema inmunológico, lo que dificulta que su cuerpo combata otras infecciones y enfermedades. Sin tratamiento, puede conducir al SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

¿Qué significa un diagnóstico de VIH?

Puede ser aterrador saber que eres VIH positivo e infectado con el virus. No existe una cura para el VIH, pero con el tratamiento y la atención adecuados, las personas con VIH pueden vivir una vida larga y plena, proteger a sus parejas y controlar el virus de manera efectiva.

¿Cómo se transmite el VIH?

El VIH se propaga de persona a persona a través del sexo oral, anal o vaginal, compartiendo agujas, jeringas u otro equipo de inyección de drogas o pinchazos accidentales con agujas (lo cual es raro). Ciertos fluidos corporales pueden transmitir el VIH, como la sangre, el semen, los fluidos vaginales o la leche materna de una madre infectada. El virus puede ingresar al cuerpo a través de un corte abierto, una llaga en la piel o a través de las membranas mucosas. Estas membranas se encuentran en el pene, la vagina, el ano, el recto, la boca, la nariz y los ojos. Las mujeres infectadas con el VIH pueden transmitir la infección a su bebé durante el embarazo, el parto y la lactancia. La lactancia materna no se recomienda para mujeres infectadas con el VIH.

¿Qué es el SIDA?

El SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es la etapa más grave del VIH que ocurre cuando el sistema inmunológico de una persona se daña tanto que el cuerpo es menos capaz de combatir infecciones y enfermedades. Las personas con SIDA pueden enfermarse gravemente por enfermedades que normalmente no serían un problema para alguien con un sistema inmunitario saludable. Estas infecciones también se denominan infecciones oportunistas.

¿Desarrollaré SIDA ahora que soy VIH positivo?

No todas las personas infectadas con el VIH desarrollarán SIDA. Hay personas que han sido VIH positivas durante más de 20 años y no han tenido ninguna enfermedad grave relacionada con el SIDA. Si no se trata, casi todos los casos de VIH se convertirán en SIDA. La progresión varía de persona a persona y depende de otros factores, incluido el estado de salud y las opciones de estilo de vida, como el consumo de alcohol, tabaco o drogas. Tomar constantemente los medicamentos recetados para el VIH puede prevenir la progresión a esta etapa.

¿Qué pasa si contraigo el SIDA?

El SIDA es una indicación de que su recuento de CD4 está por debajo de 200 y su sistema inmunológico está gravemente debilitado. Si su sistema inmunológico está dañado, no lo está protegiendo de otros tipos de infecciones y afecciones, como la neumonía y ciertos cánceres que su cuerpo normalmente puede combatir. El SIDA puede provocar una serie de síntomas y complicaciones que pueden afectar la calidad de vida de una persona. El tratamiento para el SIDA es la terapia antirretroviral y el tratamiento para otras infecciones o afecciones que se han desarrollado.

¿Tendré que tomar medicamentos?

Los medicamentos contra el VIH se recetan a todos los pacientes diagnosticados con VIH tan pronto como su médico reciba los resultados de las pruebas de laboratorio para el genotipo. Tendrá que tomar medicamentos indefinidamente.

¿Qué es la adherencia?

La adherencia se refiere a qué tan cerca sigue un régimen de tratamiento prescrito. Esto incluye medicamentos, pruebas de laboratorio y citas.

La adherencia incluye tomar sus medicamentos contra el VIH el 100% del tiempo. Incluso omitir una dosis puede permitir que el virus se reproduzca más rápidamente y cambie o mute. Esto podría dejarlo con menos opciones de tratamiento. Los estudios han demostrado que su primer régimen de medicamentos tiene las mejores posibilidades de éxito a largo plazo. Los medicamentos deben tomarse a la misma hora del día. Si olvida una dosis por unas pocas horas, puede tomarla, pero es posible que tenga que duplicarla. Las preguntas específicas sobre medicamentos pueden ser respondidas por su médico o administrador de casos. Si tiene problemas para mantenerse en un horario de medicamentos, puede configurar una alarma o alerta de teléfono celular, mantener un diario de medicamentos y/o hacer que amigos o familiares le ayuden a recordárselo. Si experimenta efectos secundarios, puede pedirle consejo a su médico o administrador de casos sobre cómo controlarlos.

Si acaba de comenzar a tomar medicamentos, es importante saber que durante las primeras 2-4 semanas, puede experimentar efectos secundarios que generalmente mejoran lentamente. Si va al hospital o está encarcelado, es posible que deba suministrar sus propios medicamentos durante al menos los primeros días, así que prepárese para tal situación. Recuerde pedir sus medicamentos con tiempo de sobra y mantener actualizados su seguro y otras coberturas.

¿El VIH/SIDA es diferente en las personas mayores?

Casi el 53% de todas las personas infectadas con VIH/SIDA en los Estados Unidos tienen 50 años o más. Los adultos mayores pueden estar lidiando con otras enfermedades y desafíos relacionados con el envejecimiento, como enfermedades cardíacas, diabetes, pérdida ósea y deterioro cognitivo. A medida que el VIH/SIDA progresa, las personas mayores necesitarán ayuda con la movilidad y el cuidado de sí mismas. Necesitarán el apoyo y la comprensión de sus médicos, familiares y amigos.

Durante el embarazo, ¿debo tomar medicamentos contra el VIH?

Continúe con sus medicamentos contra el VIH durante el embarazo. Es importante revisar sus medicamentos con su médico. Es probable que lo remitan al Programa de Inmunodeficiencia Hospitalaria para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) en Denver. Si actualmente no toma medicamentos contra el VIH, comenzará a tomar medicamentos contra el VIH para proteger a su bebé. Los medicamentos contra el VIH reducirán la cantidad de infección por VIH en el cuerpo de la madre y reducirán el riesgo de transmitir el VIH al feto. Es importante que consulte a su médico para que pueda comenzar a tomar los medicamentos correctos antes del segundo trimestre. Durante el trabajo de parto y el parto, se le administrarán medicamentos contra el VIH por infusión intravenosa y por vía oral. Si continúa el tratamiento y tiene una carga viral indetectable, su riesgo de transmitir el VIH a su bebé es inferior al 1%.

Después de que nazca el bebé, ¿el bebé necesitará tomar medicamentos para el VIH?

Sí. Se le hará la prueba del VIH al bebé y se le recetarán medicamentos líquidos orales contra el VIH durante 6 semanas.

¿Qué es la carga viral?

Cuando alguien tiene VIH, el virus se multiplica y se propaga por todo el cuerpo. Una prueba de carga viral muestra cuánto VIH activo hay en su sangre y qué tan bien está funcionando el tratamiento. Una carga viral baja significa que es menos probable que el VIH le enferme. Una carga viral indetectable significa que su carga viral está por debajo del nivel que la prueba puede medir. Incluso si su nivel es indetectable, todavía hay una pequeña cantidad de virus en su cuerpo y todavía tiene VIH. El objetivo es mantener su carga viral lo más baja posible y mantener su recuento de CD4 lo más alto posible.

¿Qué es CD4?

Las células CD4 (también conocidas como células T) son parte del sistema inmunitario que ayuda a su cuerpo a combatir los virus y las bacterias antes de que lo enfermen. Evaluar la cantidad de células CD4 que hay en su cuerpo ayuda a los médicos a ver qué tan fuerte es el sistema inmunológico de la persona y qué tan bien está luchando el cuerpo contra el virus.

¿Qué significa mutación viral?

Una "mutación" del VIH es solo un ligero cambio en una sección específica del ARN del VIH, el código genético que proporciona todas las instrucciones sobre cómo funciona el VIH. Las mutaciones ocurren naturalmente, no solo en el VIH, sino también en otros virus.

¿Con qué frecuencia necesito que me extraigan pruebas de laboratorio?

Las pruebas de laboratorio de rutina se realizan cada 3 meses o con más frecuencia según sea necesario.

Si no está tomando medicamentos contra el VIH, su sistema inmunológico debe ser monitoreado para asegurarse de que permanezca en un nivel saludable. Si está tomando medicamentos contra el VIH, los laboratorios son importantes para verificar la efectividad de sus medicamentos y que no haya efectos adversos relacionados con los medicamentos o el VIH.

- Las pruebas de CD4 (cada 3-6 meses) y de carga viral (cada 3-6 meses) proporcionan un panorama de su función inmunitaria y de la cantidad de virus presente en su cuerpo. Si su carga viral es elevada mientras está tomando medicamentos o es un paciente nuevo, se puede realizar un genotipo o fenotipo para verificar qué medicamentos son los mejores para usted.
- El CBC (cada 3-6 meses) es un “hemograma completo” que evalúa la anemia, la infección y otras afecciones.
- El CMP (cada 3-6 meses) es un “panel metabólico completo” que incluye una prueba de azúcar en la sangre y pruebas que monitorean las funciones renales y hepáticas.
- Otras pruebas anuales requeridas son las pruebas de lípidos, las pruebas de sífilis, las pruebas de tuberculosis (cada 2 años) y las pruebas de hepatitis C (cada 5 años).

Su proveedor puede repetir las pruebas y/o realizar otras pruebas si tiene problemas de salud o si los resultados de laboratorio son anormales.

¿Qué es una infección oportunista y cómo puedo protegerme de contraerla?

Las infecciones oportunistas son infecciones que su cuerpo ya no puede combatir porque el VIH ha destruido demasiadas células CD4. Para prevenir estas infecciones, se le administrarán antibióticos que tomará diariamente hasta que sus análisis de sangre indiquen que es seguro suspenderlos. Las investigaciones indican que las siguientes precauciones lo ayudarán a evitar contraer una infección oportunista: lavarse bien las manos, evitar a las personas enfermas, compartir utensilios y tazas de comida, limpiar las cajas de arena (heces de gato) y la jardinería en el suelo. Se debe practicar el sexo seguro y tomar los medicamentos según lo prescrito.

¿Qué pasa si también tengo hepatitis C?

Dado que la hepatitis C se transmite de la misma manera que el VIH, es común que los pacientes con VIH estén coinfectados. Existen tratamientos para ciertos tipos de hepatitis C que pueden proporcionar una cura (dependiendo de si el paciente es un candidato).

¿Qué hace mi administrador de casos por mí?

Se programa una cita de admisión con su administrador de casos cuando inicialmente se convierte en un paciente de EIS de PCHC. Se le proporcionará información de contacto directa para que pueda comunicarse con su administrador de casos cuando sea necesario durante el horario de oficina. Su administrador

de casos le brinda muchos servicios, que incluyen programar todas sus citas, ayudar con el cumplimiento de los medicamentos, ayudarlo a acceder a recursos de apoyo (como salud conductual, atención dental, dietética, especializada, etc.) Responde preguntas sobre cualquier aspecto de su atención y habla con usted sobre reducciones de riesgos, prácticas de sexo seguro y otros temas relevantes para el manejo de su salud.

Comuníquese primero con su administrador de casos si necesita programar o reprogramar una cita (se debe avisar con un mínimo de 48 horas de anticipación cuando sea posible). Si su administrador de casos no está disponible, puede llamar al 719-543-8711 y pedir hablar con el personal de triaje. Es importante que le diga a la enfermera de triaje que usted es un paciente de EIS. Aunque los miembros del personal de PCHC pueden recordarle las próximas citas, es su responsabilidad saber cuándo son sus citas. Si cancela una cita, la atención puede retrasarse si las citas inmediatas no están disponibles. Si no se presenta a su cita, su administrador de casos se comunicará con usted. Mantenga su dirección y número de teléfono actualizados.

¿Por qué y con qué frecuencia necesito ver a mi administrador de casos?

Debe consultar a su administrador de casos cada vez que vea a su médico y, según sea necesario, según su nivel de atención. Los administradores de casos son sus recursos individuales para asegurarse de que se satisfagan sus necesidades de atención médica. También pueden ayudarle a encontrar otros recursos en la comunidad.

¿Qué significa resistencia a los medicamentos?

La resistencia a los medicamentos contra el VIH significa una reducción en la capacidad de un medicamento, o combinación de medicamentos, para bloquear la reproducción del VIH en el cuerpo. La resistencia a los medicamentos se produce debido a cambios o mutaciones en la estructura genética del VIH. Las mutaciones pueden ser comunes en el virus del VIH si los medicamentos no se toman constantemente. El VIH se reproduce a un ritmo extremadamente rápido y no contiene las proteínas necesarias para corregir los errores que comete durante la copia. (*Fuente: www.hivworkshop.com/drug_resistance.htm*)

¿Qué hago si los medicamentos me enferman?

Los medicamentos contra el VIH, también conocidos como terapia antirretroviral (TAR), generalmente son seguros y efectivos para controlar el virus y prevenir la progresión del VIH. Sin embargo, a veces pueden causar efectos secundarios. Su médico y/o administrador de casos le informarán sobre los efectos secundarios más comunes cuando se le recete el medicamento. Los efectos secundarios comunes del medicamento incluyen:

Náuseas/vómitos/diarrea o malestar estomacal: puede experimentar náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago u otros síntomas gastrointestinales cuando comienza a tomar medicamentos contra el VIH por primera vez. Este efecto secundario generalmente mejora con el tiempo a medida que el cuerpo se adapta al medicamento. Beber la cantidad recomendada de agua y llevar una dieta equilibrada puede ayudar a controlar estos síntomas. Si tiene episodios repetidos

de vómitos y/ o diarrea durante más de 24 horas, notifique a su administrador de casos o médico.

Fatiga o debilidad: Sentirse cansado o débil es un efecto secundario común de los medicamentos contra el VIH, especialmente durante las primeras semanas de tratamiento. Este efecto secundario a menudo mejora a medida que el cuerpo se acostumbra al medicamento. Esto también puede ser causado por el estrés, la falta de sueño, las deficiencias de vitaminas y minerales, la depresión o la falta de ejercicio.

Dolores de cabeza: puede experimentar dolores de cabeza o migrañas mientras toma medicamentos contra el VIH. Estos síntomas suelen ser leves y, a menudo, se pueden aliviar con analgésicos de venta libre.

La fiebre y los síntomas similares a la gripe, como dolores, molestias y fiebre leve (menos de 100 grados) pueden deberse a los medicamentos contra el VIH. Estos síntomas también pueden ser causados por el VIH en sí.

Notifique a su administrador de casos si tiene alguna pregunta sobre sus nuevos medicamentos o posibles efectos secundarios. Su administrador de casos se comunicará con usted dentro de las 2 semanas posteriores al inicio de cualquier medicamento nuevo para asegurarse de que no tenga ningún problema.

¿Qué hago si me quedo sin medicamentos?

No debería quedarse sin nada. Asegúrese de pedir sus resurtidos de medicamentos al menos 5 días antes de que se surta su receta (2 semanas para pedidos por correo). Tenga en cuenta los fines de semana, los días festivos y los viajes que va a hacer. Su medicamento no debe ser una emergencia, y la mayoría de las farmacias no lo tratarán como tal, especialmente los pedidos por correo. Comuníquese primero con su farmacia para resurtir. Si no tiene resurtidos, pídale a la farmacia que le envíe a su médico una solicitud de resurtido. Si tiene problemas para obtener sus medicamentos, llame a su administrador de casos.

¿Qué es ADAP?

ADAP es el Programa de Asistencia de Medicamentos contra el SIDA que proporciona medicamentos a bajo costo o sin costo a personas con VIH/SIDA que no tienen una cobertura adecuada de medicamentos recetados. Las personas deben cumplir con ciertas pautas de ingresos para calificar para la asistencia. Los participantes son elegibles para postularse cada 12 meses. HIAP es un programa para ayudar a aquellos que califican con un seguro privado. SWAP es un programa para ayudar a las personas con Medicaid/Health First Colorado.

Si tiene preguntas sobre su plan Med D, puede comunicarse con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado al 877-640-0006. Para Medicaid u otras preguntas, comuníquese con el registro de PCHC al 719-543-8711. Recuerde mantener su registro actualizado.

¿Con qué frecuencia necesitaré consultar a mi médico?

Necesita ver a su médico regularmente cada 3-4 meses, para ayudarle con el tratamiento de su enfermedad, explicar la importancia de sus medicamentos y revisar los resultados de laboratorio.

¿A quién veo si mi médico no está en la clínica o si me enfermo fuera del horario de atención de la clínica?

Si está enfermo, llame a su administrador de casos al 719-543-8711. Si no puede comunicarse con su administrador de casos, la recepcionista (dependiendo de sus síntomas) programará una cita con otro proveedor de atención médica en la clínica o transferirá su llamada a triaje. La enfermera de triaje/MA lo ayudará a programar una cita con otro proveedor de atención médica en la clínica o dirigirá su atención a la sala de emergencias si sus síntomas lo indican.

Si necesita ayuda **después del horario de atención de la clínica**, llame al 719-543-8711. Una enfermera de guardia estará disponible para hacer el triaje y ayudarlo con su necesidad médica inmediata o urgente.

¿Cuándo debo ver a un dentista?

Debe ver al dentista al menos una vez al año. También es posible que necesite ver al dentista si desarrolla algún síntoma de infecciones, llagas, sangrado de las encías o dolor dental. PCHC ofrece servicios de atención de la salud bucal en dos ubicaciones, O'Rourke Dental Clinic y East Side Clinic. Su administrador de casos puede derivarlo a atención dental o puede llamar al 719-564-4823 y solicitar una cita con el dentista.

¿Cuándo debo ver a un terapeuta de salud conductual?

Debe consultar a un terapeuta de salud conductual si necesita ayuda con la depresión, la ansiedad u otras preocupaciones. También debe considerar ver a un terapeuta si su médico o administrador de casos lo sugiere. PCHC ofrece servicios de atención de salud conductual. Su médico o administrador de casos puede iniciar la derivación a salud conductual.

¿Qué sucede si debo ir al hospital?

Durante su cita de admisión de EIS, recibirá una tarjeta que le indicará al hospital que se comunique con PCHC si se encuentra en la sala de emergencias o si es admitido en el hospital. Desafortunadamente, este sistema no es perfecto, llame a su administrador de casos para que pueda colaborar con su médico en el hospital. Lleve sus medicamentos con usted en caso de que el hospital no tenga su medicamento disponible. También es importante que los médicos vean qué medicamento toma. Si ingresa en el hospital, los médicos del hospital dirigirán su atención. No suspenda sus medicamentos antes de consultar con el médico de EIS de PCHC y/o los administradores de casos.

¿Qué puedo hacer si tengo un problema con las drogas o el alcohol?

El consumo de alcohol y drogas puede causar problemas a cualquier persona, pero los pacientes con VIH tienen un riesgo mucho mayor de complicaciones. Estas sustancias podrían interactuar con sus medicamentos o interferir con su eficacia. Si está bajo la influencia de drogas o alcohol, es posible que se olvide (o se niegue) a tomar sus medicamentos, lo que conduce a una enfermedad o resistencia. Cuando está intoxicado, existe un mayor riesgo de relaciones sexuales inseguras, incluso por parte de las personas mejor intencionadas.

El abuso de drogas y alcohol es un problema de salud grave y hay tratamiento disponible. Informe a su administrador de casos si esto es un problema para usted. Su administrador de casos puede derivarlo a un tratamiento ambulatorio a través del equipo de Salud Conductual de PCHC u otra ubicación de su elección. Si se requiere tratamiento hospitalario, Southern Colorado Health Network puede ayudarlo.

¿Cómo puedo reducir mi riesgo de transmitir esta infección a otra persona? Siempre informe a su pareja que tiene VIH antes de la actividad sexual. Practique sexo seguro usando un condón para el sexo vaginal o anal. Use un condón o una barrera dental si está teniendo sexo oral. Estos productos están disponibles de forma gratuita a través de su administrador de casos.

Pregunte acerca de la PrEP (un medicamento preventivo) para su pareja.

Grupo de pacientes de EIS

La misión del Consejo Asesor del Consumidor del Pueblo Community Health Center es mejorar los resultados de la atención médica para los pacientes de EIS. Esto se hace trabajando con el personal de PCHC y otros proveedores de servicios de VIH para abogar por una atención de calidad, identificar y abordar oportunidades de mejora, y participar activamente en la concientización y divulgación sobre el VIH en la comunidad.

El Consejo Asesor del Consumidor se reúne todos los meses en uno de los centros clínicos. Este grupo está formado por consumidores y proveedores de servicios que trabajan con la comunidad VIH positiva. El Día Mundial del SIDA y el Pueblo Pride son los dos eventos principales en los que participan. Los miembros también ayudan a desarrollar la encuesta de pacientes e identificar áreas de mejora.

Para obtener detalles específicos sobre el día, la hora y el lugar de reunión del grupo, comuníquese con su administrador de casos.

¿Qué puedo hacer para estar más saludable con el VIH/SIDA?

- Tome sus medicamentos como le fueron indicados. Si tiene algún problema, comuníquese con su administrador de casos.
- Consulte a su administrador de casos, médico, dentista, dietista y/o terapeuta de salud conductual cuando esté programado.
- Participe activamente en su atención médica.
- Manténgase al día con su examen de mantenimiento de atención médica y sus vacunas.
- Si consume tabaco, suspéndalo. Hable sobre dejar de fumar con su administrador de casos, terapeuta de salud conductual y/o médico.
- Si usa drogas, suspéndalas. Discuta los servicios de rehabilitación de drogas con su administrador de casos, terapeuta de salud conductual y/o médico.
- Si usted consume alcohol, suspéndalo. Discuta los servicios de rehabilitación de alcohol con su administrador de casos, terapeuta de salud conductual y/o médico.

- Practique sexo seguro.

Otra información valiosa:

- PCHC ofrece pruebas GRATUITAS de VIH para parejas o cualquier persona que quiera hacerse la prueba. Esto se hace sin cita previa y está disponible en todas las ubicaciones de PCHC.
- Los usuarios de drogas intravenosas deben solicitar a su administrador de casos información sobre la disponibilidad del programa de intercambio de jeringas/aguja.
- Las oportunidades de investigación están disponibles. Para obtener más información sobre los ensayos de investigación clínica relacionados con el VIH u otras oportunidades, consulte a continuación:

Para obtener información de contacto de los Centros para el Control de Enfermedades, llame al Servicio de Información sobre Ensayos Clínicos sobre el SIDA al 1-800-HIV-0440. También puede visitar www.aidsinfo.nih.gov o clinicaltrials.gov para obtener información sobre ensayos clínicos locales/regionales.

¿Hay otras agencias en la comunidad que me ayuden a recibir los productos y servicios que pueda necesitar?

Sí, hay varias entidades en la región del sudeste de Colorado para ayudar a las personas con VIH/SIDA. La siguiente lista no es exhaustiva, pero es un buen punto de partida para conocer los recursos disponibles:

Programa de Asistencia de Medicamentos ADAP-SIDA o Ramsell	877-640-0006
Centros para Discapacitados en Pueblo	719-546-1271
CHIP (para embarazos a través de Children's Hospital)	720-777-8233
HOPE (Healthier Options for the Parenting Experience)	720-777-8233
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades	www.cdc.gov/hiv
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado	719-583-4300
Hepatitis C Connection	877-435-7443
Recursos y educación sobre el VIH/SIDA	www.TheBody.com
Estado de la solicitud de Medicaid	800-359-1991
Servicio al Cliente de Medicaid	800-221-3943
Noticias y Recursos	www.POZ.com
Servicios para Personas sin Hogar de Posada	719-545-8776
Departamento de Servicios Sociales de Pueblo	719-583-6160
Seguro Social de Pueblo	719-545-9248
SCHN (Southern CO Health Network)	Pueblo: 719-924-892 719-225-8682 Colorado Springs: 800-241-5468
SDAP (Programa Estatal de Asistencia para Medicamentos)	303-692-2000
Southern Colorado Harm Reduction	719-289-7149



Pueblo Community Health Center

www.PuebloCHC.org

(719) 543-8711
www.PuebloCHC.org

East Side Clinic & Pharmacy

1301 East 7th Street
Pueblo, Colorado 81001

Colorado Avenue Clinic

300 Colorado Avenue
Pueblo, Colorado 81004



Este folleto está diseñado para ser un recurso para los pacientes del Programa de Servicios de Intervención Temprana de Pueblo Community Health Center. No incluye todo y debe usarse como una guía para navegar por varios sistemas y servicios dentro del entorno de atención médica.

Diciembre de 2024